



OLIGOCHAETA



Oligochaeta spp.


- tot 3 cm
- 'regenworm'achtig
- gelijkend op *C. capitata* (Polychaeta)

POLYCHAETA (1/2)




Capitella capitata

- tot 8 cm
- lichaam tweeledig



Magelona johnstoni

- tot 6 cm
- afgeplatte kop




Lanice conchilega

- tot 10 cm
- opvallende zandkoker



vooreinde




achtereinde

Microphthalmus similis


- enkele mm
- talrijke 'tentakels'

Spionidae (palpen veelal afgebroken!)




Spio spp.

- Tot 4 cm
- kieuwen vanaf eerste segment



Polydora spp.

- tot 3 cm
- hakenrij op vijfde segment




Pygospio elegans

- tot 4 cm
- geen kieuwen op eerste segmenten

Scolelepis squamata


- tot 8 cm
- zeer spitse kop



Spiophanes bombyx


- tot 5 cm
- 'hoortjes' op kop

POLYCHAETA (2/2)




Eteone longa

- tot 5 cm
- 2 ogen
- korte antennen




Glycera spp.

- tot 10 cm
- vier kleine antennen



Hesionura augeneri

- tot 2 cm
- geen ogen
- tentakels




Paraonis fulgens

- tot 5 cm
- sterk afgeplat



Psammodrillus balanoglossoides

- tot 3 cm
- 'vreemd' tweede segment




Ophelia rathkei

- tot 4 cm
- spoelvormig




Nephtys spp.

- tot 15 cm
- duidelijke 'poten'




Phyllodoce spp.

- tot 10 cm
- 2 ogen
- duidelijke tentakels



Harmothoe spp.

- tot 2 cm
- elythren aanwezig




Sigalion mathildae

- tot 10 cm
- elythren aanwezig

AMPHIPODA


Urothoe spp.

- tot 1 cm
- bolvormig
- harig
- 3 soorten




Oedicerotidae spp.

- tot 1 cm
- zijdelings afgeplat
- afgeronde kop
- 2 soorten




Talitridae spp.

- tot 1,5 cm
- zijdelingsafgeplat
- korte eerste antenne
- 2 soorten




Haustorius arenarius

- tot 2 cm
- zijdelings afgeplat
- geen ogen
- zeer harig




Bathyporeia spp.

- tot 1 cm
- zijdelings afgeplat
- geknikte eerste antenne





B. pelagica

- 2 paar haren




- 1 paar haren



Corophium spp.


- tot 1 cm
- zeer grote tweede antenne
- 1 soort

B



B. sarsi


- vrij hoog



B. pilosa


- vrij laag

COPEPODA



Calanoida spp.


- tot 1 cm
- spoelvormig
- lange antennen



Harpacticoida spp.

- tot 0,5 cm
- spoelvormig
- korte antennen


CUMACEA



Cumopsis goodsiri

- tot 1 cm
- langgerekt lichaam
- veelal 'komma'vormig


MYSIDACEA



Gastrosaccus spinifer

- tot 2 cm
- 'garnaal'achtig
- zijdelings afgeplat


ISOPODA



Eurydice spp.

- tot 1 cm
- afgeplat
- zwarte vlekken


OSTRACODA



Ostracoda spp.


- enkele mm
- 'boon'vormig

DECAPODA




Diogenes pugilator

- tot 2 cm
- Heremietskreeft



Crangon crangon


- tot 4 cm
- afgeplat



Portumnus latipes


- tot 2 cm
- afgeplatte achterpoten

BIVALVIA




Fabulina fabula

- tot 2,5 cm
- zeer broos
- rechter klep schuin gestreept




Macoma balthica

- tot 2 cm
- vrij stevig gebouwd
- veel kleurvarianten




Angulus tenuis

- tot 2,5 cm
- zeer broos
- rechter klep niet schuin gestreept




Mytilus edulis

- tot 7 cm
- zwart
- aangespoeld






Donax vittatus

- Tot 3 cm
- stevig gebouwd
- gezaagde schelpen



Cerastoderma edule

- tot 4 cm
- stevig gebouwd
- radiërende ribbels



Spisula subtruncata

- tot 3 cm
- vrij stevig gebouwd
- asymmetrisch

